

Zarcero pálido occidental o bereber

Iduna opaca




CATEGORÍA DE AMENAZA

CNEA	CAEA	LRAE	LRVA
-	-	NT	DD

¿DÓNDE VERLO?

HUELVA	SEVILLA	CÓRDOBA	JAÉN
H-1	SE-1	CO-1	J-1
H-2	SE-2	CO-2	J-2
H-3	SE-3	CO-3	J-3
H-4	SE-4	CO-4	J-4
H-5	SE-5	CO-5	J-5
H-6	SE-6	CO-6	J-6
H-7	SE-7	CO-7	J-7
H-8	SE-8	CO-8	J-8
H-9	SE-9	CO-9	J-9
H-10	SE-10	CO-10	J-10
H-11	SE-11	CO-11	J-11
H-12	SE-12	CO-12	J-12
H-13	SE-13	CO-13	J-13
H-14	SE-14	CO-14	J-14
H-15	SE-15	CO-15	J-15
H-16			
H-17			



ESTATUS

Estival y migrante.

POBLACIÓN

Muy escaso.

HÁBITAT

Sotos fluviales, especialmente tarajales bien desarrollados y en combinación con vegetación palustre, álamos, chopos, adelfas, etc. Secundariamente, y en menor grado, ocupa algunas riberas arbustivas de adelfas y tamujos.

FENOLOGÍA

Llega a mediados de abril, y los últimos se marchan a finales de septiembre, aunque algunas aves podrían registrarse hasta octubre.

DISTRIBUCIÓN

El mayor núcleo reproductor se encuentra en las riberas del Guadalquivir entre Adamuz y Villanueva de la Reina, así como en la desembocadura del Jándula (El Rincón). Por su parte, en la zona occidental se ven aves en época estival en arroyos tributarios del río Chanza. En migración debe presentarse en más lugares, contando con citas en huertos del entorno de Cazalla de la Sierra, la rivera de Ciudadaja o - ya fuera de nuestro territorio- en la rivera de Huelva por La Minilla, por ejemplo.